


**Азеластин** является противоаллергическим лекарственным средством. Относится к группе антигистаминных препаратов, селективный блокатор рецепторов H1 второго поколения. Применяется чаще всего для лечения легкого, средней степени тяжести и тяжелого сезонного ринита, а также легкого круглогодичного ринита. Азеластин выпускается в форме назального спрея (0,1%, а в США 0,15%) и в форме глазных капель (0,05%). В некоторых странах назальный спрей и глазные капли, содержащие азеластин, продаются в аптеках без рецепта.

Оглавление:

- [1 Метаболизм и фармакокинетика](#)
- [2 Эффекты азеластина](#)
- [3 Показания к применению](#)
- [4 Безопасность и взаимодействия](#)
- [5 Рецепт азеластина на латинском](#)
- [6 Торговые наименования](#)

## Метаболизм и фармакокинетика

Системная биодоступность азеластина при интраназальном применении достигает 40%. Максимальная концентрация в плазме крови наблюдается примерно с 2 до 3 часов после применения.



Азеластин

Азеластин метаболизируется семейством цитохрома P450 в дезметилазеластин, который является активным метаболитом, и в два неактивных метаболита карбоновых кислот. Практически 75% пероральной дозы выводится с фекалиями.

Фармакокинетические свойства перорального введения не зависят от возраста или пола и не влияют на функцию печени.

## Эффекты азеластина

Азеластин оказывает тройное воздействие на организм:

- антигистаминное;
- стабилизация тучных клеток;
- противовоспалительное;

Действие азеластина наступает быстро: примерно через 15 минут при употреблении в виде назального спрея и 3 минуты при использовании глазных капель. Эффект длится до 12 часов.

## Показания к применению

Азеластин применяется как назальный спрей у взрослых и детей с 6 лет для локального лечения симптомов сезонного аллергического ринита (сенная лихорадка) и круглогодичного аллергического ринита, которые включают в себя общие проявления: ринорея (отделяемое из носовых ходов), частое чихание, зуд в носу.

В некоторых странах азеластин применяется для лечения неаллергического насморка (вазомоторного ринита) у взрослых и детей с 12 лет.

Глазные капли, содержащие азеластин, используются для местного лечения сезонного или круглогодичного аллергического конъюнктивита.

## Безопасность и взаимодействия



Азеластин безопасен для применения

Азеластинсодержащий назальный спрей безопасен для использования и применяется у взрослых и детей с 6 лет, которые страдают аллергическим ринитом и хорошо у них переносится. Наиболее часто упоминаемые побочные эффекты включают в себя: горький привкус во рту, головные боли, ожоги носа и сонливость.

В аннотации к применению азеластина в США не рекомендуется его применять одновременно с алкоголем и другими медикаментами, которые влияют на центральную нервную систему.

В некоторых исследованиях сонливость встречалась с одинаковой частотой (около 2%) в плацебогруппе и в группе, которая принимала азеластин.

Проблема с горьким вкусом во рту может решиться при помощи корректного применения назального спрея (например голову немного наклонить вперед и не слишком глубоко вдыхать препарат) или, как альтернатива, использовать сукралозосодержащий азеластин.

При управлении транспортным средством или эксплуатации тяжелой техники нежелательным эффектом может оказаться усталость, поэтому рекомендуется соблюдать осторожность.

## Рецепт азеластина на латинском

Рецепт азеластина может выписываться в виде глазных капель и спрея. Глазные капли выпускаются во [флаконах](#) в виде [раствора](#). **В некоторых странах азеластин доступен в аптеках без рецепта.** Если же нужно выписать рецепт, то можно выписывать действующее вещество, а также определенное торговое наименование. Рассмотрим примеры выписки действующего вещества:

Rp.: Azelastini 0,05% — 10 ml  
D.S. В глаз по 1 капле 3 раза в день

Rp. Spray Azelastini 0,1% — 10 ml (70 doses)  
D.S. По 1 дозе в каждый носовой ход 2 раза в день

И рецепт торгового названия, например рецепт аллергодила на латинском:

Rp. Spray «Allergodil» (70 doses)  
D.S. По 1 вдоху через носовую полость

## Торговые наименования

Назальные спреи азеластина одобрены в около 60 странах мира и продаются как монопрепарат под различными торговыми марками:

*Allergodil* (DE), *Astelin* (USA), *Astepro* (USA), *Rhinolast* (GB), *Vividrin* (AK), *Akut* (DE), *Afluon* (ES).