

Рецепт альмагеля на латинском выписывается в зависимости от формы, в которой Вы хотите его назначить. Альмагель может выписываться в форме суспензии (альмагель, альмагель А) и в форме таблеток (альмагель Т). Рецепт у этих двух форм, конечно, выписывается по разному. А теперь обо всем по порядку.


- Альмагель содержит в себе 2 вещества: гидроксид алюминия и гидроксид магния.
- Альмагель А содержит, кроме предыдущих, еще и бензокаин (анестезин).
- Альмагель Т состоит из вещества «магалдрат» — алюминия магния гидроксид сульфат.

Оглавление:

- [1 Рецепт альмагеля в форме суспензии](#)
- [2 Рецепт альмагеля на латинском в таблетках](#)

Рецепт альмагеля в форме суспензии

- **Альмагель** выпускается в форме суспензии объемом по 170 и по 200 мл. Назначается чаще всего по 1-2 чайные ложки суспензии за 30 минут до еды и на ночь, то есть 2 раза в день.
- **Альмагель А** выпускается также в форме суспензии по 170 и 200 мл. Назначается также по 1-2 чайные ложки суспензии детям и взрослым за 30 минут до еды и перед сном.



Рецепт альмагеля на латинском в форме суспензии будет выписываться также как и все [рецепты суспензии на латинском](#).

Вначале указываем Recipe — Rp., если оно еще не указано — с латинского «возьми». Далее после двоеточия указываем лекарственную форму, Susp. — Suspensionis — «суспензии». Затем, поскольку альмагель это коммерческое название, пишем Almagel в этой же строке и берем его в кавычки. Уже получилось вот так:

Rp.: Susp. «Almagel»

Затем необходимо в этой же строке указать объем, как уже говорилось выше мы можем выбрать из 2: 170 и 200 мл. Возьмем 200 мл, можно написать 0,2, а можно 200 ml, тут уж как Вам будет удобнее.

Rp.: Susp. «Almagel» 200 ml

Затем со следующей строки указываем сколько штук выдать — D.t.d. N — Da tales doses numero — «выдай количеством» или, если Вы хотите выписать только 1 флакон, просто пишем D.S. — Da Signa — выдай и обозначь. В конце заполняем сигнатуру.

Rp.: Susp. «Almagel» 200 ml

D.S. Внутрь по 1 чайной ложке утром до еды и вечером.

или

Rp.: Susp. «Almagel» 200 ml

D.t.d. N 5

S. Внутрь по 2 чайные ложки утром за 30 минут до еды и перед сном

Поскольку рецепт альмагеля на латинском в форме суспензии выписывается во флаконах, то как и во всех [рецептах флаконов на латинском](#) не нужно указывать в чем выдавать, флаконы как бы подразумеваются.

Рецепт альмагеля на латинском в таблетках

Рецепт альмагеля в таблетках будет выписываться как и все остальные [рецепты таблеток на латинском](#). Отличие от алгоритма, описанного выше, заключается только в одном — необходимо указать фармацевту, что необходимо выдать альмагель (в нашем случае это **альмагель Т**) в таблетках — in tab. — in tabulettas.



Выпишем рецепт альмагеля на латинском в таблетках (альмагель Т) дозировкой 500 мг двумя способами:

1. Rp.: «Almagel» 500 мг
D.t.d. N 30 in tab.
S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день
2. Rp.: Tab. «Almagel» 500 мг
D.t.d. N 30
S. Внутрь по 2 таблетки утром до еды